

# Úvod do populační genetiky

# Populační genetika

- Obor zabývající se genetickou variabilitou v populacích a procesy, které ji ovlivňují.
- Snaha vysvětlit evoluci pomocí mechanismů měnících frekvence alel v populaci.



# Hardy-Weinbergův zákon



Godfrey Hardy

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$



Wilhelm Weinberg


p ..... frekvence alely A

q ..... frekvence alely a

$p^2$  ..... frekvence genotypu AA

$q^2$  ..... frekvence genotypu aa

$2pq$  ..... frekvence genotypu Aa



$$p^2 = 2/10 = 0,2$$

$$q^2 = 3/10 = 0,3$$

$$2pq = 5/10 = 0,5$$


$$p = \sqrt{0,2} = 0,45$$

$$q = \sqrt{0,3} = 0,55$$


# Hardy-Weinbergův zákon

Přetrvávání škodlivých recessivních mutací v populaci.

Vzácné alely skryty v heterozygotech.



Nejvíce heterozygotů v populaci při stejné frekvenci obou alel.



Cystická fibróza  
recessivní homozygoti 1 z 1700  
heterozygoti 1 z 24

# Hardy-Weinbergův zákon pro více alel

2 alely

$$(p + q)^2 = 1$$

$$p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

3 alely

$$(p + q + r)^2 = 1$$

$$p^2 + q^2 + r^2 + 2pq + 2pr + 2qr = 1$$

4 alely

$$(p + q + r + s)^2 = 1$$


$$p^2 + q^2 + r^2 + s^2 + 2pq + 2pr + 2ps + 2qr + 2qs + 2rs = 1$$

atd.


# Předpoklady Hardy-Weinbergovy rovnováhy

- Dostatečně velká populace, ve které se jedinci párují zcela náhodně bez ohledu na genotyp/fenotyp jedinců (**panmiktická populace**). Nehraje roli vzdálenost mezi jedinci. Neprobíhá selekce.
- Stačí jedna generace náhodného křížení, aby se ustavila HW rovnováha.
- To, zda je populace v HW rovnováze se může lišit pro různé geny v genomu.

4. Large Population



5. Random Mating



## Jak zjistíme, zda je populace v Hardy-Weinbergově rovnováze?

Genotypy	Pozorované počty
AA	125
Aa	550
aa	310

# Testování odchylky od Hardy-Weinbergovy rovnováhy

## Odhad frekvence alel

Genotypy	Pozorované počty
AA	125
Aa	550
aa	325
celkem	1000



$$f_A = \frac{2 \times 125 + 550}{2 \times 1000} = 0,4$$

$$f_a = 1 - A = 0,6$$



## Odhad očekávaných počtů genotypů

$$\begin{aligned} AA & 1000 \times (0,4)^2 = 160 \\ Aa & 1000 \times 2(0,4)(0,6) = 480 \\ aa & 1000 \times (0,6)^2 = 360 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} AA & 125 - 160 = -35 \\ Aa & 550 - 480 = 70 \\ aa & 325 - 360 = -35 \end{aligned}$$

## Chi-square statistika ( $\chi^2$ )

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{pozorované} - \text{očekávané})^2}{\text{očekávané}}$$

## Počet stupnů volnosti (df)

počet porovnávaných tříd

- počet odhadovaných parametrů
- 1

## Chi-square test

$$\chi^2 = \frac{(-35)^2}{160} + \frac{(70)^2}{480} + \frac{(-35)^2}{360} = 21,27$$

$$df = 3-1-1=1$$

$$p < 0.01$$

Populace není v HW rovnováze.

# Mechanismy způsobující odchylku od HW rovnováhy

## Nenáhodné (asortativní) párování


### Pozitivní asortativní párování

- Jedinci s podobnými genotypy se vzájemně párují s větší pravděpodobností. Vede k přebytku homozygotů v populaci.
- Např. příbuzenské křížení (inbreeding)
- Vede k odhalení škodlivých recesivních mutací (inbrední deprese).
- V přírodě dochází k inbreedingu také v extrémně malých populacích.



# Inbreeding

- V laboratoři se využívá při vytváření inbredních kmenů.




## Koeficient inbreedingu (F)


Pravděpodobnost, že jedinec zdědil obě alely určitého genu od jednoho předka.

$$F = (1/2)^n$$

n = počet jedinců v genealogii od daného jedince  
ke společnému předkovi




$$F = (1/2)^3 = 1/8$$



$$F = 1/8 + 1/8 = 1/4$$


## Negativní asortativní párování

- Jedinci s odlišnými genotypy se vzájemně párují s větší pravděpodobností.
- Vede k přebytku heterozygotů.
- V přírodě nastává např. pokud jsou zvýhodněni heterozygoti.
  - MHC I (*Major Histocompatibility Complex I*) geny



## Geografická struktura populace

- Brání náhodnému párování mezi jedinci.
- Snížení celkové heterozygotnosti ve strukturované populaci = **Wahlundův princip**.




# Odhad míry geografické strukturovanosti populací

## $F_{ST}$ statistika


Proporce o kterou je snížená heterozygotnost subpopulací ve srovnání s očekávanou heterozygotností za předpokladu náhodného křížení mezi všemi jedinci.

$$F_{ST} = \frac{H_T - H_S}{H_T}$$

$H_T$  očekávaná heterozygotnost pro celkovou populaci  
 $H_S$  očekávaná heterozygotnost pro subpopulace



$$F_{ST} = 1$$



$$F_{ST} = 0$$

- = aa genotype
- = Aa genotype
- = AA genotype

## Příklad

Jaké je  $F_{ST}$  mezi dvěma populacemi?

	Počty genotypů			
	AA	Aa	aa	
subpopulace 1	25	50	25	100
subpopulace 2	49	42	9	100
celková populace	74	92	34	200

Frekvence alel	
p	q
0,5	0,5
0,7	0,3
0,6	0,4


$$H_T = 2pq = 2 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,48$$

$$H_S = p_1q_1 + p_2q_2 = 0,25 + 0,21 = 0,46$$


$$F_{ST} = 0,0416$$

$$F_{ST} = \frac{H_T - H_S}{H_T}$$


# Mechanismy měnící frekvence alel v populaci



mutace



drift






migrace



selekce


# Genetický drift

- Náhodné změny ve frekvencích alel v omezeně velkých populacích.
- Působí silněji v malých populacích.
- Ochuzuje genetickou variabilitu populace.
- Směr genetického driftu je náhodný.
- Pravděpodobnost fixace alely působením genetického driftu odpovídá její frekvenci v populaci.
- Doba fixace neutrální mutace je  $4Ne$  (generací).




# Genetický drift působí silně i při krátkodobém zmenšení velikosti populace


## Efekt hrdla lahve



## Efekt zakladatele




# Genetický drift způsobuje rozrůznění izolovaných populací




# Efektivní velikost populace ( $N_e$ )

- Vyjadřuje velikost ideální panmiktické populace, ve které genetické procesy (např. genetický drift) probíhají stejnou rychlostí jako v dané reálné populaci.

Panmiktická populace  
 $N = 100$



Reálná populace  
?




Síla genetického driftu stejná.

# Faktory ovlivňující efektivní velikost populace

## Kolísavá velikost populace, efekt hrdla lahve, efekt zakladatele

- $N_e$  odráží nejen současnou velikost populace, ale také velikost populace v minulosti.
- U populací s proměnlivou velikostí se  $N_e$  blíží spíše nižším hodnotám celkového počtu jedinců v populaci.



## Faktory ovlivňující efektivní velikost populace

### Nenáhodné křížení a rozdílný počet rozmnožujících se samic a samců

- Vede ke snížení efektivní velikosti populace.




$$N_e = \frac{4N_m N_f}{N_m + N_f}$$



# Faktory ovlivňující efektivní velikost populace

## Rozptyl v počtu potomků mezi jedinci (selekce)

- $N_e$  se rovná skutečnému počtu jedinců pokud počty potomků jednotlivých jedinců mají Poisson rozložení. Tzn. rozptyl v počtu potomků je stejný jako průměrný počet potomků.
- Pokud je rozptyl větší,  $N_e$  je nižší než skutečný počet jedinců v populaci.



## Odhady efektivní velikosti populace u různých druhů

**~ 10 000**



**~ 30 000**



**~ 2 000 000**




**~ 1 000 000**



**~ 100 000**




## Efektivní velikost populace závisí na životních strategiích organismů




# Mutace jako zdroj genetické variability


## Bodové/genové mutace




## Genomové mutace



## Chromosomové mutace




# Čím je daná mutační rychlosť



# Mutační rychlosť ( $\mu$ )

- frekvencia nových mutácií na generaci
- $\mu = 0.01$  (1 mutácia na 100 jedincov na 1 generaci)





- Mutační rychlosť (pro nukleotidové substitúcie) u ľudí je cca  $1 \cdot 10^{-8}$ .  
(necelých 100 nových nukleotidových substitúcií v celom genomu na jedinco)


# Mutační rychlosť

Je odlišná pro různé typy mutací

- rozsáhlejší mutace obecně méně časté
- mutační „hotspots“: CpG u živočichů, mikrosateliity.
- tranzice vznikají častěji než transverze




## mikrosatelit



# Mutační rychlosť

Je odlišná pro různé geny v rámci genomu

- Ovlivněna např. mírou transkripce dané sekvence, blízkostí k replikačnímu počátku, pozici nukleozomu.
- Mutační rychlosť u živočichů cca 10 x větší na mt DNA než v jaderné DNA



## Mutační rychlosť mitochondriální a plastidové DNA u rostlin

GBE

Mutation Rates in Plastid Genomes: They Are Lower than You Might Think

David Roy Smith\*

Department of Biology, University of Western Ontario, London, ON, Canada


\*Corresponding author. E-mail: dsmith242@uwo.ca.

Accepted: April 9, 2015

# Mutační rychlosť

## Liší se u různých organismů

- velikost genomu, efektivní velikost populace, velikost těla, intenzita metabolismu....



Nature Reviews | Genetics

Lynch et al. 2016

# Mutační rychlosť v germinálnej linii somatických tkánich

Table 1. Mutation rates per nucleotide site ( $\times 10^{-9}$ ) in different tissues<sup>a</sup>


Species	Tissue	Cell divisions per generation <sup>a</sup>	Mutation rates <sup>b</sup>	
			Per generation	Per cell division
<i>Homo sapiens</i>	Germline	216	12.85	0.06
	Retina	55	54.45	0.99
	Intestinal epithelium	600	162.00	0.27
	Fibroblast (culture)			1.34
	Lymphocytes (culture)			1.47
<i>Mus musculus</i>	Male germline	39	38.00	0.97
	Brain		76.94	
	Colon		83.35	
	Epidermis		90.38	
	Intestine		117.69	
	Liver		237.88	
	Lung		166.83	
<i>Rattus norvegicus</i>	Spleen		130.00	
	Colon		178.38	
	Kidney		167.45	
	Liver		179.92	
	Lung		223.22	
	Mammary gland		57.70	
	Prostate		448.90	
<i>Drosophila melanogaster</i>	Spleen		101.62	
	Germline	36	4.65	0.13
	Whole body		380.92	
<i>Caenorhabditis elegans</i>	Germline	9	5.60	0.62
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Germline	40	6.50	0.16
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>		1	0.33	0.33
<i>Escherichia coli</i>		1	0.26	0.26

<sup>a</sup>References to data on numbers of germline cell divisions: human [Crow 2000]; *D. melanogaster* and mouse [57]; *C. elegans* [58]; and *A. thaliana* [59]. Numbers of cell divisions are unknown for the mouse and rat rates.

<sup>b</sup>Mammalian tissue-specific rates are given only for tissues in which at least two independent estimates have been acquired. All data on human mutation rates are taken from Lynch [36]. Data for somatic mutation rates in mouse and rat are derived from references contained within the supplementary material online. References to data on germline mutation rates are: *D. melanogaster* [5], *C. elegans* [4], *A. thaliana* [Ossowski *et al.*, 2009], *S. cerevisiae* [3], and *E. coli* [24].

# Většinu mutací dědíme od otců

- Většina nukleotidových substitucí vzniká v samčí germinální linii (více replikací DNA) (**male-driven evolution**).
- Počet nově vzniklých nukleotidových substitucí vzrůstá s věkem otce (paternal age effect).
- Rozdíl v mutační rychlosti mezi autosomy a pohlavními chromosomy.



Campbell and Eicher, 2013

# Genetická diverzita - genetický polymorfismus ( $\theta$ )

Pro neutrální sekvence platí:

$$\theta = 4N_e \mu$$

Polymorfní (segregující) místo

Sequence 1

Sequence 2

Sequence 3

Sequence 4

A A T G T C A A C G  
A A T G T C A A C G  
A T T G T C A A C G  
A T T G T G A T C G

\* \* \*

haplotyp

- Míra genetického polymorfismu v populaci závisí přímoúměrně na mutační rychlosti a velikosti populace.

# Empirické odhady genetické diverzity v populaci

## Nukleotidová diverzita (průměrná heterozygozita) ( $\pi$ )

Sequence 1	A A T G T C A A C G
Sequence 2	A A T G T C A A C G
Sequence 3	A T T G T C A A C G
Sequence 4	A T T G T G A T C G
Site number	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nucleotide diversity ( $\pi$ ):

1 A A T G T C A A C G       $d_{12} = 0$   
2 A A T G T C A A C G

1 A A T G T C A A C G       $d_{13} = 1$   
3 A T T G T C A A C G

1 A A T G T C A A C G       $d_{14} = 3$   
4 A T T G T G A T C G

2 A A T G T C A A C G       $d_{23} = 1$   
3 A T T G T C A A C G

2 A A T G T C A A C G       $d_{24} = 3$   
4 A T T G T G A T C G

3 A T T G T C A A C G       $d_{34} = 2$   
4 A T T G T G A T C G

$$\Sigma d_{ij} = 0 + 1 + 3 + 1 + 3 + 2 = 10$$

Number of pairs of sequences compared =  $[n(n - 1)]/2 = [4(3)]/2 = 6$

$\hat{\pi} = 10 \text{ differences}/6 \text{ pairs} = 1.67$  average pairwise differences

$\hat{\pi} = 1.67 \text{ avg. differences}/10 \text{ sites} = 0.167$  pairwise differences per site

## Proporce polymorfních míst ( $\theta_w$ )

Sequence 1	A A T G T C A A C G
Sequence 2	A A T G T C A A C G
Sequence 3	A T T G T C A A C G
Sequence 4	A T T G T G A T C G
Site number	* * *

Segregating sites ( $S$  and  $p_S$ ):

Sites 2, 6, and 8 have variable base pairs among the four sequences (columns marked with \*).

These are segregating sites. Therefore, for these sequences  $S=3$  segregating sites and  $p_S=3/10=0.3$  segregating sites per nucleotide site examined.

$$\theta = S / n / H_{k-1}$$

$$H_{k-1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$S$  ... počet segregujících míst

$n$  ... počet nukleotidů v sekvenci

$k$  ... počet sekvencí


$H_{k-1}$  ... harmonické číslo

$$\theta = 3 / 10 / 1,83 = 0,164$$


Za předpokladu neutrality by měly být oba odhady genetické diverzity stejné.

# Migrace (m)

- **Migrační rychlosť (m):** pravděpodobnosť, že jedinec z jedné populace nahradí jedince druhé populace (vztaženo na jedince a generaci).
- **Populačná migračná rýchlosť (Nm):** počet migrantov za generaci




## Vztah mezi $F_{ST}$ a populační migrační rychlostí ( $Nm$ )




- Pokud  $Nm > 1$  je efekt migrace silnější než efekt genetického driftu, nedojde ke genetickému rozrůznění populací.

## Isolation by distance (izolace vzdáleností)

Míra genetické differenciace ( $F_{ST}$ ) vzrůstá s geografickou vzdáleností.  
Vzniká když míra migrace je vyšší mezi geograficky bližšími populacemi.



# Genová introgrese (genový tok)



Přenos jednotlivých genů z jedné populace do druhé pomocí zpětného křížení.

# Adaptivní introgrese



Myš domácí (*Mus musculus*) získala alely k rezistenci vůči warfarinu z myši středozemní (*Mus spretus*).

## Adaptivní introgrese: Co jsme zdědili od neandrtálců?

- Neafrická lidská populace 2-4% genomu původem od neandrtálců.
- V Tibetské populaci mutace v genu EPAS1 usnadňuje život ve vysokých nadmořských výškách. Původem z neandrtálců.
- U inuitů fixované alely genů WARS2 a TBX15 původem z Denisovanů. Hrají roli v adaptaci na chladné podnebí (vytváření adipocytů a tepla).
- Adaptivní introgrese se také týká genů ovlivňujících kvalitu a zbarvení kůže a srsti a dále genů imunitního systému.
- Některé alely získané od neandrtálců způsobují choroby (např. obezitu, deprese).



## Evoluční genetika referáty - 2021

**15.11.2021**

**Student**

Fate of a father's mitochondria

Bohumil Fiala

Can reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA integrate into the genome?

Lucie Korená

Gene drive: progress and prospects

Magdalena Bélová

Programmed DNA Elimination

Yuliia Leščenko

Soma-to-germline RNA communication

Kateřina Černá

Rapid evolution at the Drosophila telomere: transposable element dynamics at an intrinsically unstable locus

Yuliia Arishaka

Movement of transposable elements contributes to cichlid diversity

Convergent Evolution of LINE-1 in Coat Color: A Case Study in Water Buffaloes

Filip Blaštík

The Genetic Basis of Morphological Diversity in Domesticated Goldfish

Jan Vintr

**13.12.2021**

Breaking a species barrier by enabling hybrid recombination

Speciation by sexual selection: 20 years of progress

Vojtěch Waldhauser

Speciation across the Tree of Life

Hybrid sterility genes in mice: a peculiar case of PRDM9 incompatibility

A signature of Neanderthal introgression on molecular mechanisms of environmental responses

Prevalence and Adaptive Impact of Introgression